

**Schizophrenia in Greenland. Jacobsen AS, Pedersen ML.  
*Dan Med J.* 2021. Januar 7;68(2):A03200159**

## Formål

- At undersøge prævalens af skizofreni i Grønland som helhed og i hovedstaden Nuuk
- At beskrive patienternes demografiske, socioøkonomiske og somatiske sundhedstilstand

## Metode

- En tværsnit- registerundersøgelse baseret på gennemgang af alle patientjournaler med skizofrenidiagnose og adresse i Grønland
- Det blev registreret patienternes alder, køn, sociodemografiske faktorer, neuroleptisk behandling, evt misbrug, rygestatus, vægt, blodtryk, kolesterol og langtidsblodsukker

## Prævalens

Prævalens	Grønland	Nuuk
I alt	0,8 %	1,0 %
Mænd	1,1 %	1,3 %
Kvinder	0,5 %	0,6 %

Højeste prævalens 1,8 %, blandt mænd mellem 15-34 år


## Sociodemografiske karakteristika

Boligforhold	Med partner	Familie	Bosted	Hjemløs
	10 %	18 %	31 %	2 %

	%
Uden uddannelse	86,5
Arbejdsløs	72,2
Cannabisforbrug/misbrug	52,1
Dom til behandling	24,0

## Somatiske risikofaktorer

	Tilgængelige tal i %	%
Rygning	8,4 %	91,3 % rygere
BMI	17,9 %	38,8 % overvægtige
Blodtryk	61,9 %	26,0 % hypertension
Total kolesterol	68,1 %	23,1 % forhøjet Totalkoles.



## Opsummering

- Prævalensen i Nuuk (1,0%) er lidt større end internationalt (0,5-0,9%)
- Den højeste prævalens (1,8%) blev registreret blandt unge mænd mellem 15-34 år
- Mand/kvinderatio (2,5) er betydelig højere end internationalt (1,4)
- De dårlige socioøkonomiske forhold følger den kendte internationale mønster men er en tand ringere. Betydelig flere ptr. bo på bosted (31 % versus 5,5 %)
- Betydelig flere grønlandske end danske patienter er dømt til behandling (24% versus 8%)
- Monitorering af somatiske risikofaktorer er ikke optimal

**Nielsen, IM. (2022) Physical health in psychiatric patients with schizophrenia in the capital of Greenland.**

*A cross-sectional register study*